

Алгоритм действий в случае присасывания клеща

Присосавшихся к телу клещей следует немедленно удалить!

Удаление присосавшегося клеща лучше проводить в медицинской организации: по месту жительства, в амбулатории, в фельдшерском пункте, скорой медицинской помощи.

Если нет возможности немедленно обратиться в медицинскую организацию, то снимать клеща следует очень осторожно, стараясь не оторвать погруженный в хоботок, который глубоко и сильно укрепляется на весь период присасывания.

Чем быстрее Вы это сделаете, тем меньше шансов, что в кровь попадут опасные возбудители.

Снимать клещей лучше с использованием специальных приспособлений: "Ручка-лассо" или "Клещеверт"

При отсутствии специальных приспособлений удалить клеща можно при помощи нитки, которую необходимо завязать вокруг хоботка клеща и вращая или покачивая, тянуть вверх.

Кроме этого можно использовать пинцет с тонкими кончиками или захватить клеща ногтями как можно ближе к коже за хоботок и держа строго перпендикулярно поверхности укуса повернуть тело клеща вокруг оси, извлечь его из кожных покровов.

Нет смысла что-либо капать на клеща и ждать когда он сам отпадет. Клещ не отпадет, а пока Вы будете ждать, он продолжит вводить в кровь возбудителей. После извлечения клеща необходимо руки тщательно вымыть с мылом. Место укуса продезинфицировать любым пригодным для этих целей средством: 70% спирт, 5% йод или одеколон.

Снятого клеща следует поместить в плотно закрывающуюся емкость, поместив туда кусочек влажной ваты или ткани, и доставить в лабораторию для проведения исследования не позднее 2-х суток (г.Котлас, г. Архангельск)

Профилактические меры при присасывании клеща непривитым взрослым: ЙОДАНТИПИРИН 1 таб — 100 мг

по 300 мг (3 таблетки) — 3 раза в день в течение первых 2-х дней;
по 200 мг (2 таблетки) — 3 раза в день в течение следующих 2-х дней;
по 100 мг (1 таблетка) — 3 раза в день в течение следующих 5-ти дней.

Профилактические меры при присасывании клеща непривитым детям:

введение иммуноглобулина (на ФАП, в амбулатории, СМП п.Урдома, хирургическом отделении Яренской ЦРБ)

В случае обнаружения в клещах возбудителей одной или нескольких инфекций необходимо с результатами анализа обратиться к врачу-инфекционисту или терапевту в поликлинике, которые дадут соответствующие рекомендации по профилактике развития заболеваний.